

C07 QUIMICA ORGANICA (compuestos tales como óxidos, sulfuros u oxisulfuros de carbono, cianógeno, fosgeno, ácido cianhídrico o sus sales C01; productos obtenidos a partir de silicatos cambiadores de base, en capas, por cambio de iones con compuestos orgánicos tales como compuestos amonio, fosfonio o sulfonio o por inserción de compuestos orgánicos C01B 33/44; compuestos macromoleculares C08; colorantes C09; productos de fermentación C12; procesos de fermentación o procesos que utilizan enzimas para la síntesis de un compuesto químico dado o de una composición dada o para la separación de isómeros ópticos a partir de una mezcla racémica C12P; producción de compuestos orgánicos por electrolisis o electroforesis C25B 3/00, C25B 7/00) [2]

C07K PEPTIDOS (péptidos para la alimentación A23, p. ej. obtención de composiciones a base de proteínas para la alimentación A23J; preparaciones de uso médico A61K; péptidos que contienen β -lactamas C07D; dipéptidos cíclicos que no tienen en su molécula ningún otro enlace peptídico más que los que forman su ciclo, p. ej. piperazina diones-2,5, C07D; alcaloides del cornezuelo del centeno de tipo péptido cíclico C07D 519/02; compuestos macromoleculares que contienen unidades aminoácido repartidas de manera estadística en sus moléculas, es decir, compuestos cuya preparación no da una secuencia específica, sino una secuencia aleatoria de unidades aminoácido, homopoliamidas o copoliamidas secundarias derivadas de aminoácidos C08G 69/00; productos macromoleculares derivados de proteínas C08H 1/00; preparación de cola fuerte o de gelatina C09H; proteínas monocelulares, enzimas C12N; procedimientos de obtención de péptidos por ingeniería genética C12N 15/00; composiciones para medida, investigación o análisis en las que intervienen enzimas C12Q; investigación o análisis de material biológico G01N 33/00) [4]

- (1) En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:
- “aminoácidos” son compuestos en los que al menos un grupo amino y al menos un grupo carboxilo están unidos a la misma estructura carbonada, pudiendo formar parte de un ciclo el átomo de nitrógeno del grupo amino;
 - “enlace peptídico normal” es un enlace entre un grupo alfa-amino de un aminoácido y el grupo carboxilo –en posición 1– de otro alfa-aminoácido;
 - “enlace peptídico anormal” es aquel en el que al menos uno de los aminoácidos implicados no es un alfa-aminoácido, o un enlace formado por al menos un grupo carboxilo o amino de la cadena lateral de un alfa-aminoácido;
 - “péptidos” son compuestos que contienen por lo menos dos unidades de aminoácidos, que están unidas por al menos un enlace peptídico normal, incluyendo oligopéptidos, polipéptidos y proteínas, donde
 - (i) “péptidos lineales” pueden contener ciclos formados por enlaces S–S, o por un grupo hidroxilo o mercapto de un hidroxilo- o de un mercapto-aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido (p. ej. péptidos lactónicos) pero no comprendiendo ciclos formados solamente por enlaces peptídicos;
 - (ii) “péptidos cíclicos” son péptidos que contienen al menos un ciclo formado solamente por enlaces peptídicos; la ciclación sólo puede hacerse por enlaces peptídicos normales o anormales, p. ej. por el grupo amino-4 del ácido diamino-2,4 butanoico. Por tanto, los compuestos cíclicos en los que al menos un enlace en el ciclo es un enlace no peptídico, se consideran como “péptidos lineales”;
 - (iii) “depsipéptidos” son compuestos que contienen una secuencia de al menos dos alfa-aminoácidos y al menos un ácido alfa-hidroxicarboxílico, unidos por al menos un enlace peptídico normal y un enlace éster, derivados de estos ácidos hidroxicarboxílicos, en los que
 - (a) “depsipéptidos lineales” pueden contener ciclos formados por enlaces S–S, o por un grupo hidroxilo o mercapto de un hidroxilo- o de un mercapto-aminoácido y el grupo carboxilo de otro amino- o hidroxilo-ácido, pero no contienen ciclos formados solamente por enlaces peptídicos o éster derivados de ácidos hidroxicarboxílicos, p. ej. Gly-Ala-Gly–OCH₂CO₂H y Gly–OCH₂CO-Ala-Gly se consideran como “depsipéptidos lineales”, pero HOCH₂CO-Gly-Ala-Gly que no contiene enlace éster es por tanto un derivado de Gly-Ala-Gly que está previsto en C07K 5/08;
 - (b) “depsipéptidos cíclicos” son péptidos que contienen al menos un ciclo formado solamente por enlaces peptídicos o éster, –derivados de ácidos hidroxicarboxílicos –, p. ej.
- ; [4]
- (iv) “péptidos híbridos” son péptidos producidos por fusión o unión covalente de dos o más péptidos heterólogos.
- (2) *Es importante tener en cuenta la Nota (3) después de la clase C07, la cuál establece que la regla de prioridad del último lugar se aplica entre las subclases C07C Hasta C07K y dentro de estas subclases.* [8]
- (3) La actividad terapéutica de los compuestos se clasifica además en la subclase A61P. [7]
- (4) *Cuando se clasifique en esta subclase, también se clasifica en el grupo B01D 15/08 si materia de interés general relativa a cromatografía está concernida.* [8]
- (5) Los fragmentos de péptidos o péptidos modificados por eliminación o adición de aminoácidos, por sustitución de unos aminoácidos por otros, o por combinación de estas modificaciones son clasificados como los péptidos de los que proceden. Sin embargo, los fragmentos peptídicos que sólo tienen cuatro aminoácidos o menos son también clasificados en el grupo C07K 5/00. [6]
- (6) Los péptidos obtenidos mediante procedimientos químicos y con una secuencia aminoácida derivada de péptidos de origen natural son clasificados con el péptido natural. [6]
- (7) Los péptidos obtenidos mediante tecnología de ADN recombinante no son clasificados según el huésped, sino de acuerdo con el péptido expresado originalmente, p. ej. el péptido VIH expresado en E. coli se clasifica con los péptidos VIH. [6]

Esquema general**PEPTIDOS**

Preparación	1/00
de un número de indeterminado de aminoácidos	2/00
Hasta 20 aminoácidos en una secuencia indeterminada o sólo parcialmente determinada	4/00
Hasta 20 aminoácidos en una secuencia totalmente determinada.....	5/00 Hasta 9/00

Depsipéptidos de hasta 20 aminoácidos en una secuencia totalmente determinada.....	11/00
Con más de 20 aminoácidos	14/00
Inmunoglobulinas	16/00
Péptidos unidos a un transportador ("carrier") o inmovilizados	17/00
Péptidos híbridos	19/00

1/00 Procedimientos generales de preparación de péptidos [4]

- 1/02 . en solución [4]
- 1/04 . sobre soportes [4]
- 1/06 . utilizando grupos protectores o agentes de activación [4]
- 1/08 . . utilizando agentes de activación [4]
- 1/10 . utilizando agentes de acoplamiento [4]
- 1/107 . por modificación química de los péptidos precursores [6]
- 1/113 . . sin cambio de la estructura primaria [6]
- 1/12 . por hidrólisis [4]
- 1/13 . Marcaje de péptidos [6]
- 1/14 . Extracción; Separación; Purificación [4,6]
- 1/16 . . por cromatografía [6]
- 1/18 . . . Cromatografía de intercambio iónico [6]
- 1/20 . . . Cromatografía de partición, fase inversa o hidrófoba [6]
- 1/22 . . . Cromatografía de afinidad o técnicas análogas basadas en procesos de absorción selectiva [6]
- 1/24 . . por medios electroquímicos [6]
- 1/26 . . . Electroforesis [6]
- 1/28 . . . Focalización isoelectrica [6]
- 1/30 . . por precipitación [6]
- 1/32 . . . en forma de complejos [6]
- 1/34 . . por filtración, ultrafiltración u ósmosis inversa [6]
- 1/36 . . por una combinación de varios procesos de diferentes tipos [6]

2/00 Péptidos con un número indeterminado de aminoácidos; Sus derivados [6]**4/00 Péptidos con hasta 20 aminoácidos en una secuencia indeterminada o sólo parcialmente determinada; Sus derivados [6]**

- 4/02 . de virus [6]
- 4/04 . de bacterias [6]
- 4/06 . de hongos [6]
- 4/08 . de algas; de líquenes [6]
- 4/10 . de vegetales [6]
- 4/12 . de animales; de humanos [6]

5/00 Péptidos con hasta cuatro aminoácidos en una secuencia totalmente determinada; Sus derivados [4]**Nota**

En el presente grupo, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado: [6]
 – “primer aminoácido” significa el primero empezando por la izquierda, es decir, el aminoácido N-terminal de la secuencia peptídica. [6]

- 5/02 . que contienen al menos un enlace peptídico anormal [4]
- 5/023 . . que contienen al menos un beta-aminoácido [6]
- 5/027 . . que contienen al menos un gamma-aminoácido, p. ej. estatina [6]
- 5/03 . . que contienen al menos un delta-aminoácido, p. ej. isósteres [6]
- 5/033 . . que contienen al menos un epsilon o un zeta-aminoácido [6]
- 5/037 . . el enlace anormal lo forma la cadena lateral de un alfa-aminoácido, p. ej. gamma-Glu, epsilon-Lys, glutatión [6]
- 5/04 . conteniendo sólo enlaces peptídicos normales [4]
- 5/06 . . Dipéptidos [4]
- 5/062 . . . la cadena lateral del primer aminoácido es acíclica, p. ej. Gly, Ala [6]
- 5/065 . . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene carbociclos, p. ej. Phe, Tyr [6]
- 5/068 . . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos amino que grupos carboxilo, o sus derivados, p. ej. Lys, Arg [6]
- 5/072 . . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos carboxilo que grupos amino, o sus derivados, p. ej. Asp, Glu, Asn [6]
- 5/075 Asp-Phe; Sus derivados, p. ej. aspartamo [6]
- 5/078 . . . el primer aminoácido es heterocíclico, p. ej. Pro, His, Trp [6]
- 5/08 . . Tripéptidos [4]
- 5/083 . . . la cadena lateral del primer aminoácido es acíclica, p. ej. Gly, Ala [6]
- 5/087 . . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene carbociclos, p. ej. Phe, Tyr [6]
- 5/09 . . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos amino que grupos carboxilo, o sus derivados, p. ej. Lys, Arg [6]
- 5/093 . . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos carboxilo que grupos amino, o sus derivados, p. ej. Asp, Glu, Asn [6]
- 5/097 . . . el primer aminoácido es heterocíclico, p. ej. Pro, His, Trp, p. ej. tiroliberina, melanostatina [6]
- 5/10 . . Tretapéptidos [4]
- 5/103 . . . la cadena lateral del primer aminoácido es acíclica, p. ej. Gly, Ala [6]

5/107	• • •	la cadena lateral del primer aminoácido contiene carbociclos, p. ej. Phe, Tyr [6]	14/045	• • • •	Citomegalovirus [6]
5/11	• • •	la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos amino que grupos carboxilo, o sus derivados, p. ej. Lys, Arg [6]	14/05	• • • •	Virus Epstein-Barr [6]
5/113	• • •	la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos carboxilo que grupos amino, o sus derivados, p. ej. Asp, Glu, Asn [6]	14/055	• • • •	Virus de la enfermedad de Marek [6]
5/117	• • •	el primer aminoácido es heterocíclico, p. ej. Pro, His, Trp [6]	14/06	• • • •	Virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina [6]
5/12	• •	Péptidos cíclicos [4]	14/065	• • •	Poxviridae, p. ej. avipoxvirus [6]
7/00		Péptidos con 5 a 20 aminoácidos en una secuencia totalmente determinada; Sus derivados [4,6]	14/07	• • • •	Virus de la vacuna; Virus de la viruela [6]
7/02	•	Péptidos lineales que contienen al menos un enlace peptídico anormal [4]	14/075	• • •	Adenoviridae [6]
7/04	•	Péptidos lineales que contienen solamente enlaces peptídicos normales [4]	14/08	• •	Virus ARN [6]
7/06	• •	con 5 a 11 aminoácidos [4]	14/085	• • •	Picornaviridae, p. ej. virus Cocksackie, ecovirus, enterovirus [6]
7/08	• •	con 12 a 20 aminoácidos (gastrinas C07K 14/595; somatostatinas C07K 14/655; melanotropinas C07K 14/68) [4,6]	14/09	• • • •	Virus de la fiebre aftosa [6]
7/14	• •	Angiotensinas; Péptidos semejantes [4]	14/095	• • • •	Rhinovirus [6]
7/16	• •	Oxitocinas; Vasopresinas; Péptidos semejantes [4]	14/10	• • • •	Virus de la hepatitis A [6]
7/18	• •	Kalidinas; Bradiquininas; Péptidos semejantes [4]	14/105	• • • •	Virus de la poliomieltis [6]
7/22	• •	Eledoisinas; Péptidos semejantes [4]	14/11	• • •	Orthomyxoviridae, p. ej. virus de la influenza [6]
7/23	• •	Hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH); Péptidos semejantes [6]	14/115	• • •	Paramyxoviridae, p. ej. virus de la parainfluenza [6]
7/28	• •	Gramicidinas A, B, D; Péptidos semejantes [4]	14/12	• • •	Virus de la parotiditis; Virus del sarampión [6]
7/50	•	Péptidos cíclicos que contienen al menos un enlace peptídico anormal [4]	14/125	• • • •	Virus de la enfermedad de Newcastle [6]
7/52	• •	conteniendo sólo enlaces peptídicos normales en el ciclo [4]	14/13	• • • •	Virus del moquillo canino [6]
7/54	• •	conteniendo al menos un enlace peptídico anormal en el ciclo [4]	14/135	• • • •	Virus respiratorio sincitial [6]
7/56	• • •	cicladados de forma distinta que por el ácido diamino-2,4 butanoico [4]	14/14	• • •	Reoviridae, p. ej. rotavirus, virus de la lengua azul de la oveja, virus de la fiebre de garrapatas del Colorado [6]
7/58	• • • •	Bacitracinas; Péptidos semejantes [4]	14/145	• • •	Rhabdoviridae, p. ej. virus de la rabia, virus Duvénhage, virus Mokda, virus de la estomatitis vesicular [6]
7/60	• • •	cicladados por el grupo amino-4 del ácido diamino-2,4 butanoico [4]	14/15	• • •	Retroviridae, p. ej. virus de la leucemia bovina, virus de la leucemia felina, virus linfotrópico de células T humanas [6]
7/62	• • • •	Polimixinas; Péptidos semejantes [4]	14/155	• • • •	Lentiviridae, p. ej. virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus visnavaedi, virus de la anemia infecciosa equina [6]
7/64	•	Péptidos cíclicos que contienen solamente enlaces peptídicos normales [4]	14/16	• • • •	VIH-1 [6]
7/66	• •	Gramicidinas S, C; Tiocidinas A, B, C; Péptidos semejantes [4]	14/165	• • •	Coronaviridae, p. ej. virus de la bronquitis infecciosa aviar [6]
9/00		Péptidos de hasta 20 aminoácidos, que contienen radicales sacáridos y una secuencia totalmente determinada; Sus derivados [4,6]	14/17	• • • •	Virus de la gastroenteritis transmisible del cerdo [6]
11/00		Depsipéptidos que contienen hasta 20 aminoácidos en una secuencia totalmente determinada; Sus derivados [4,6]	14/175	• • •	Bunyaviridae, p. ej. virus de la encefalitis californiana, virus de la fiebre del Rift Valley, virus Hantaan [6]
11/02	•	cíclicos, p. ej. valinomicinas [4]	14/18	• • •	Togaviridae, p. ej. Flavivirus, virus de la peste, virus de la fiebre amarilla, virus de la hepatitis C, virus de la encefalitis japonesa [6]
14/00		Péptidos con más de 20 aminoácidos; Gastrinas; Somatostatinas; Melanotropinas; Sus derivados [6]	14/185	• • • •	Virus de la peste porcina [6]
14/005	•	de origen vírico [6]	14/19	• • • •	Virus de la rubeola [6]
14/01	• •	virus ADN [6]	14/195	•	de origen bacteriano [6]
14/015	• • •	Parvoviridae, p. ej. virus de la panleucopenia felina, parvovirus humano [6]			
14/02	• • •	Hepadnaviridae, p. ej. virus de la hepatitis B [6]			
14/025	• • •	Papovaviridae, p. ej. virus de papiloma, virus del polioima, SV40, virus BK, virus JC [6]			
14/03	• • •	Herpetoviridae, p. ej. virus de la pseudorabia [6]			
14/035	• • • •	Virus herpes simple I o II [6]			
14/04	• • • •	Herpesvirus varicellae [6]			
			Nota		
					En los grupos C07K 14/20 Hasta C07K 14/365, después del nombre de la bacteria se indica entre paréntesis, en su caso, el orden (O), la familia (F) o el género (G). [6]
			14/20	• •	de Spirochaetales (O), p. ej. Treponema, Leptospira [6]
			14/205	• •	de Campylobacter (G) [6]
			14/21	• •	de Pseudomonadaceae (F) [6]
			14/215	• •	de Halobacteriaceae (F) [6]
			14/22	• •	de Neisseriaceae (F), p. ej. Acinetobacter [6]
			14/225	• •	de Alcaligenes (G) [6]
			14/23	• •	de Brucella (G) [6]

14/235	. . .	de Bordetella (G) [6]	14/505	. . .	Eritropoyetina (EPO) [6]
14/24	. . .	de Enterobacteriaceae (F), p. ej. Citrobacter, Serratia, Proteus, Providencia, Morganella, Yersinia [6]	14/51	. . .	Factor morfogénico óseo; Osteogenina; Factor osteogénico; Factor óseoinductor [6]
14/245	. . .	Escherichia (G) [6]	14/515	. . .	Factor angiogénico; Angiogenina [6]
14/25	. . .	Shigella (G) [6]	14/52	. . .	Citoquinas; Linfoquinas; Interferones [6]
14/255	. . .	Salmonella (G) [6]	14/525	. . .	Factor de necrosis tumoral (TNF) [6]
14/26	. . .	Klebsiella (G) [6]	14/53	. . .	Factor estimulante de colonias (CSF) [6]
14/265	. . .	Enterobacter (G) [6]	14/535	. . .	CSF de granulocitos; CSF de granulocitos-macrófagos [6]
14/27	. . .	Erwinia (G) [6]	14/54	. . .	Interleuquinas (IL) [6]
14/275	. . .	Hafnia (G) [6]	14/545	. . .	IL-1 [6]
14/28	. . .	de Vibrionaceae (F) [6]	14/55	. . .	IL-2 [6]
14/285	. . .	de Pasteurellaceae (F), p. ej. Haemophilus influenza [6]	14/555	. . .	Interferones (IFN) [6]
14/29	. . .	de Rickettsiales (O) [6]	14/56	. . .	IFN alfa [6]
14/295	. . .	de Chlamydiales (O) [6]	14/565	. . .	IFN beta [6]
14/30	. . .	de Mycoplasmatales, p. ej. microorganismos del tipo Pleuropneumonia (PPLO) [6]	14/57	. . .	IFN gamma [6]
14/305	. . .	de Micrococcaceae (F) [6]	14/575	. . .	Hormonas (derivadas de pro-opiomelanocortina, pro-enkefalina o pro-dinorfina C07K 14/665, p. ej. corticotropina C07K 14/695) [6]
14/31	. . .	de Staphylococcus (G) [6]	14/58	. . .	Complejo del factor natriurético atrial; Atriopeptina; Péptido natriurético atrial (ANP); Cardionatrina; Cardiodilatina [6]
14/315	. . .	de Streptococcus (G), p. ej. Enterococci [6]	14/585	. . .	Calcitoninas [6]
14/32	. . .	de Bacillus (G) [6]	14/59	. . .	Hormona estimulante del folículo (FSH); Gonadotropinas coriónicas, p. ej. HCG; Hormona luteinizante (LH); Hormona estimulante del tiroides (TSH) [6]
14/325	. . .	Péptido cristalino de Bacillus thuringiensis (delta-endotoxina) [6]	14/595	. . .	Gastrinas; Colecistoquinas (CCK) [6]
14/33	. . .	de Clostridium (G) [6]	14/60	. . .	Factor de liberación de la hormona del crecimiento (GH-RF) (Somatoliberina) [6]
14/335	. . .	de Lactobacillus (G) [6]	14/605	. . .	Glucagones [6]
14/34	. . .	de Corynebacterium (G) [6]	14/61	. . .	Hormona del crecimiento (GH) (Somatotropina) [6]
14/345	. . .	de Brevibacterium (G) [6]	14/615	. . .	Extracción de fuentes naturales [6]
14/35	. . .	de Mycobacteriaceae (F) [6]	14/62	. . .	Insulinas [6]
14/355	. . .	de Nocardia (G) [6]	14/625	. . .	Extracción de fuentes naturales [6]
14/36	. . .	de Actinomyces; de Streptomyces (G) [6]	14/63	. . .	Motilinas [6]
14/365	. . .	de Actinoplanes (G) [6]	14/635	. . .	Hormona paratiroidea (parathormona); Péptidos relacionados con la hormona paratiroidea [6]
14/37	. . .	de hongos [6]	14/64	. . .	Relaxinas [6]
14/375	. . .	de Basidiomycetes [6]	14/645	. . .	Secretinas [6]
14/38	. . .	de Aspergillus [6]	14/65	. . .	Factores de crecimiento de tipo insulina (Somatomedinas), p. ej. IGF-1, IGF-2 [6]
14/385	. . .	de Penicillium [6]	14/655	. . .	Somatostatinas [6]
14/39	. . .	de levaduras [6]	14/66	. . .	Timopoyetinas [6]
14/395	. . .	de Saccharomyces [6]	14/665	. . .	derivadas de pro-opiomelanocortina, pro-enkefalina o pro-dinorfina [6]
14/40	. . .	de Candida [6]	14/67	. . .	Lipotropinas, p. ej. lipotropina beta o gamma [6]
14/405	. . .	de algas [6]	14/675	. . .	beta-endorfinas [6]
14/41	. . .	de líquenes [6]	14/68	. . .	Hormona estimulante de los melanocitos (MSH) [6]
14/415	. . .	de vegetales [6]	14/685	. . .	alfa-melanotropina [6]
14/42	. . .	Lectinas, p. ej. concanavalina, fitohemaglutinina [6]	14/69	. . .	beta-melanotropina [6]
14/425	. . .	Zeínas [6]	14/695	. . .	Corticotropina (ACTH) [6]
14/43	. . .	Taumatina [6]	14/70	. . .	Encefalinas [6]
14/435	. . .	de animales; de humanos [6]	14/705	. . .	Receptores; Antígenos celulares de superficie; Determinantes celulares de superficie [6]
14/44	. . .	de protozoos [6]	14/71	. . .	para factores de crecimiento; para reguladores de crecimiento [6]
14/445	. . .	Plasmodium [6]	14/715	. . .	para citoquinas; para linfoquinas; para interferones [6]
14/45	. . .	Toxoplasma [6]	14/72	. . .	para hormonas [6]
14/455	. . .	Eimeria [6]	14/725	. . .	receptores de células T [6]
14/46	. . .	de vertebrados [6]	14/73	. . .	CD4 [6]
14/465	. . .	de aves [6]			
14/47	. . .	de mamíferos [6]			
14/475	. . .	Factores de crecimiento; Reguladores de crecimiento [6]			
14/48	. . .	Factor de crecimiento de tejido nervioso (NGF) [6]			
14/485	. . .	Factor de crecimiento epidérmico (EGF) (urogastrona) [6]			
14/49	. . .	Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) [6]			
14/495	. . .	Factor de crecimiento transformante (TGF) [6]			
14/50	. . .	Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) [6]			

14/735	. . .	Receptores Fc [6]	16/18	. .	contra materiales animales o humanos [6]
14/74	. . .	Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) [6]	16/20	. .	de protozoos [6]
14/745	. .	Factores de coagulación sanguínea o de fibrinolisis [6]	16/22	. .	contra factores de crecimiento [6]
14/75	. . .	Fibrinógeno [6]	16/24	. .	contra citoquinas, linfoquinas o interferones [6]
14/755	. . .	Factores VIII [6]	16/26	. .	contra hormonas [6]
14/76	. .	Albúminas [6]	16/28	. .	contra receptores, antígenos celulares de superficie o determinantes celulares de superficie [6]
14/765	. . .	Seroalbúmina, p. ej. HSA [6]	16/30	. . .	de células tumorales [6]
14/77	. . .	Ovoalbúmina [6]	16/32	. .	contra productos de traducción de oncogenes [6]
14/775	. .	Apolipopéptidos [6]	16/34	. .	contra antígenos de grupo sanguíneo [6]
14/78	. .	Péptidos del tejido conectivo, p. ej. colágeno, elastina, laminina, fibronectina, vitronectina, globulina insoluble en frío (CIG) [6]	16/36	. .	contra factores de coagulación sanguínea [6]
14/785	. .	Péptidos surfactantes alveolares; Péptidos surfactantes pulmonares [6]	16/38	. .	contra inhibidores de proteasa de estructura peptídica [6]
14/79	. .	Transferrinas, p. ej. lactoferrinas, ovotransferrinas [6]	16/40	. .	contra enzimas [6]
14/795	. .	Péptidos que contienen anillos de porfirina o corrina [6]	16/42	. .	contra inmunoglobulinas (anticuerpos anti-idiotípicos) [6]
14/80	. .	Citocromos [6]	16/44	. .	contra material no previsto [6]
14/805	. .	Hemoglobinas; Mioglobinas [6]	16/46	. .	Inmunoglobulinas híbridas (híbridos de una inmunoglobulina con un péptido distinto de una inmunoglobulina C07K 19/00) [6]
14/81	. .	Inhibidores de proteasa [6]	17/00	Péptidos fijados sobre un soporte o inmovilizados (enzimas fijadas sobre un soporte o inmovilizadas C12N 11/00); Su preparación [4]	
14/815	. . .	de sanguijuelas, p. ej. hirudina, eglina [6]	17/02	. .	Péptidos inmovilizados, o en, un soporte orgánico [4]
14/82	. .	Productos de traducción de oncogenes [6]	17/04	. . .	encerrados en el interior del soporte, p. ej. en un gel, en una fibra hueca [4]
14/825	. .	Metalotioneínas [6]	17/06	. .	unidos al soporte <u>por medio de</u> un agente de unión [4]
16/00	Inmunoglobulinas, p. ej. anticuerpos mono o policlonales [6]		17/08	. .	siendo el soporte un polímero sintético [4]
16/02	. .	del huevo [6]	17/10	. .	siendo el soporte un hidrato de carbono [4]
16/04	. .	de la leche [6]	17/12	. . .	Celulosa o sus derivados [4]
16/06	. .	del suero [6]	17/14	. .	Péptidos inmovilizados sobre, o en, un soporte inorgánico [4]
16/08	. .	contra materiales víricos [6]	19/00	Péptidos híbridos [6]	
16/10	. .	de virus ARN [6]			
16/12	. .	contra materiales bacterianos [6]			
16/14	. .	contra materiales de hongos, algas o líquenes [6]			
16/16	. .	contra materiales vegetales [6]			